



Naturskyddsföreningen
Ystad

SKYLT NR 4 A

Brännässla. (*Urtica dioica*). Blomtid: juni-juli.

Brännässla är avskydd av många, men för många fjärilar är den



livsviktig för fjärilslarverna.

Ett litet område med nässlor i trädgården kan ge livsutrymme åt många arter fjärilar och andra insekter.

När fjärilshonorna har parat sig flyger de omkring och letar upp brännässlor.

Där lägger de sina ägg på bladens undersida och när äggen kläckts efter någon vecka äter larverna sig stora på näringen i nässlans blad.


Nässelfjäril. (*Aglais urticae*) Flygtid: april-september

Fjärilen övervintrar som fullbordad fjäril. Under tidig vår sker parning och äggen läggs på centimeterhöga plantor av brännässla.

Efter en månads utveckling har larv och puppa utvecklats till en färdig fjäril.

De gamla fjärilarna kan dö, men ofta hinner nässelfjärilen med en sommar-och en höstgeneration i Skåne.

På hösten letar de nya fjärilarna upp något skrymsle att övervintra i.





Naturskyddsföreningen
Ystad

SKYLT NR 4 B

Påfågelöga. (*Inachis io*).

Flygtid: mars - september

Vårens budbärare!

När fjärilen krupit ut ur vintergömslet i mars letar den efter tidiga vårväxter, t ex **tussilago** och **sälg**, för att få energi från söt nektar i blommorna.

Under våren parar sig fjärilarna och letar efter larvernas värdväxt,

brännässla. Där lägger honan ca 500 ägg på bladens undersida. Fjärilarna som övervintrat dör sedan.


Efter en vecka kläcks äggen och larverna äter glupskt på brännässlans blad under 3-4 veckor. Då bildar de puppor. Efter 2 veckors puppstadium kryper den färdiga fjärilen fram och vecklar ut sina vackra vingar.

När den sedan flyger letar den efter röda och blå blommor, t ex tistlar och åkervädd, för att suga energirik nektar.

Framåt hösten övervintrar fjärilen i vegetationen eller uthus.



Vinbärsfuks. (*Polygonia c-album*)



Flygtid: mars-september

Levnadssätt som påfågelöga.

Näringskällor är savande träd och nedfallen frukt.

Snabbflygare.