



SKYLT NR 7 A



Bergsyra. (Rumex acetocella)

Bergsyra, som andra syror, trivs på öppna ängar och hedar. Den bildar grupper av plantor.

Växten är skildkönad, dvs vissa plantor är honkönade, andra hankönade.

Bladen smakar syrligt. Man ska inte äta många blad eftersom de innehåller oxalsyra som är giftigt i större mängder.

Andra vanliga syror är **rödsyra** och **ängssyra**.



Mindre guldvinge. (Lycaena hlaeas)

Flygtid: maj - oktober

Blåvingar och guldvingar ingår i gruppen juvelvingar.

Mindre guldvinge är en kvick liten fjäril som trivs på öppna stigar, hedar och gläntor. Den är lokaltrogen utmed en stig t ex.

Den fullbildade fjärilen suger nektar från t ex backtimjan och andra låga växter.

Den sitter ofta stilla på en blomma och med vingarna utbredda mot solen. Den är orädd och man kan komma ganska nära den.

Hanarna patrullerar ett revir från en utsiktspunkt i väntan på parningsvilliga honor.

Äggen läggs utspridda ett och ett eller parvis på bladen av **bergsyra** eller **ängssyra**.

Fjärilen kan bilda flera generationer under en säsong.

Övervintring sker som halv vuxen larv, som växer till sig på våren och bildar puppa under mossor och lav. Fullbildade fjärilar syns i maj.

En egendomlighet hos guldvingar är att de samlas och **övernattar tillsammans i grupp** på ett öppet fält. De sitter på var sitt grässtrå med huvudena nedåt. Detta kan minska risken för att bli tagna av spindlar.



SKYLT NR 7 B

Gräs.

Olika arter av gräs är värdväxter för gruppen **gräsfjärilar**.



Tuvtåtel. (*Deschampsia caespitosa*)

Tuvtåtel är ett mycket vanligt storväxt flerårigt gräs som trivs i olika miljöer. Som namnet anger så växer det i stora täta tuvor med stora yviga vippor.

Bladen känns sträva, nästan vassa, på tungan och gillas inte av betesdjur.

Tuvtåtel är värdväxt för kvickgräsfjärilen.



Kvickgräsfjäril. (*Pararge aegeria*) Flygtid: maj - juni och juli - augusti

Kvickgräsfjärilen trivs i skuggig skog med små soliga gläntor.

Äggen läggs ett och ett på tuvtåtelns blad. Andra värdväxter är gräsen **lundskafing**, **hundäxing**, **bergslok**, **storven**, **bergrör**, **piprör** och **lundslok**.

I södra Sverige bildas två generationer under en säsong.



Sandgräsfjäril.

(*ipparchia semele*) Flygtid: juli - september

Som namnet anger så trivs **sandgräsfjärilen** på sand, klippor eller småsten. Den finns på öar och kuster i Syd-och Mellansverige, men även i Vänern.

Värdväxt är bl a **fårsvingel** och **sandrör**. Den är brun med ögonfläckar på ovansidan av vingarna.

När den vilar fäller den samman vingarna och lutar vingarna så att så lite skugga som

möjligt bildas av solskenet så att kroppen kan värmas. Den är ganska svår att upptäcka.

Skyddsteckningen smälter samman med underlagets färger.