

SKYLT 10 A

Gräsfjärilar och deras värdväxter.



Fårsvingel. (*Festuca ovina*)

Det vanliga gräset är några decimeter högt med något sträva grågröna spetsiga blad. Det växer i tuvor på öppna ängar och betesmarker.

Vippan har utstående grenar åt tre håll. Den drar ihop sig efter blomning.

Följeväxter är **backtimjan, bockrot och gökärt**.

Kamgräsfjäril. (*Coenonympha pamphilus*) Flygtid. maj - juni och juli - augusti

Denna vanliga lilla fjäril flyger i torra, kortväxta, blomrika gräsmarker.

Vingarnas ovansidor är orangefärgade med ögonfläck på framvingarna

Hanarna leker med varandra runt landmärken, håller revir och strider om de bästa platserna i t ex något ensamt litet träd. De väntar på honorna som flyger högt för att visa att de är parningsvilliga. Honorna flyger sedan tätt över marken och lägger äggen ett och ett på grässtrån efter leken.

Två generationer bildas under en säsong. Larverna i den andra generationen övervintrar som nästan fullväxta.





SKYLT 10 B



Slåttergräsfjäril. (Maniola jurtina)

Flygtid: juli - augusti

Slåttergräsfjärilen är större än kamgräsfjärilen och har ett annat mönster på bakvingens undersida. Vingarnas ovansidor är mörkbruna med ögonfläck på framvingarna.

Den flyger senare på säsongen än kamgräsfjärilen. Den har ett stort antal värdväxter bland gräs- och starrarter. Här kan nämnas **hundäxing, kamäxing, knägräs och timotej**.

Äggen läggs utspridda ett och ett på olika gräsarters blad. Larvutvecklingen är långsam, så larven övervintrar ej fullt utvecklad. Efter övervintringen växer den färdig fram till juni. Därefter sker förpuppning och den färdiga fjärilen flyger i slutet av juni till början av juli.



Luktgräsfjäril. (Aphantopus hyperantus)

Flygtid: juni - augusti

Luktgräsfjärilen gillar öppna områden med högre gräsarter. Det luftburna kvävenedfallet har gynnat högre gräsarter, som i sin tur har gynnat luktgräsfjärilen. Den har därför ökat i sin förekomst tvärt emot andra gräsfjärilar som föredrar kortare grässvål.

Vingarnas ovansida är mörkt brunfärgade.

Många fjärilar har s k **doftfjäll** på sina vingar. Doften attraherar honorna. Hanarna hos luktgräsfjäril försöker föra in sina framvingar mellan honans för att hon ska känna doften och bli villig till parning. Efter parning söker sig honorna ner i markens vegetation för att slippa undan hanarnas uppvaktning.